n.° 3.

Observation sur le decollement de l'epiphyse du Col du femur, par M. de Villiers m.e en chirurgie a Paris.

Au commencement d'avril 1741. un enfant agé de dix ans tomba plusieurs marches d'un escalier. lorsqu'il fut relevé, on s'apercut qu'il ne pouvoit se soutenir sur la cuisse et la jambe gauche. sa mere le fit voir dans le meme moment a un chirurgien qui n'ayant rien trouvé de luxé ni de cassé dit qu'il n'y avoit que foulure, en consequence se contenta de donner des fomentations avec de l'eau de vie et le reste, ce qui ayant été executé l'espace de quinze jours sans succès, on le fit voir a d'autres chirurgiens et bailleurs, lesquels n'y ayant rien trouvé non plus ordonnerent a peu près comme les premiers. cinq mois s'etant ecoulés pendant lesquels l'articulation de cette cuisse et toute sa partie superieure sont devenues d'un volume si considerable qu'elle avoit deux pieds trois pouces de tour sur la fin d'aoust. la mere ayant appris que j'etois revenu a Paris, elle m'aporta cet enfant; je trouvai que la tumeur formoit a la circonference de l'article un bourrelet et [illegible] sans douleur et sans inflammation, ce qui me fit augurer que la matiere qui la formoit etoit lymphatique et synoviale, encore contenue dans la capsule, quoyque malgré le volume de la tumeur elle se bornoit autour de l'article. ajoutez que la cuisse et la jambe malades etoient plus courts que l'autre de quatre travers de doigts, que cet enfant n'avoit point &c.

ARC 41 n° 104
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE